

Terminarz oprysków drzew owocowych 2018

W terminarzu uwzględniono nowości 2018 - naturalne preparaty Lecitec (oparty na lecytynie), Evasiol (substancja uzyskana ze skrzypu polnego) i Guard (dobroczynne bakterie)

Roślina	Choroba lub szkodnik	Profilaktyka	Metoda niechemiczna	Metoda chemiczna
Okres bezlisnty				
drzewa owocowe	parch jabłoni, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, parch gruszy, drobna plamistość liści	Prześwietlenie koron	wyciąg z krwawnika pospolitego (1:10)	
drzewa owocowe	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	zbieranie i niszczenie zaschniętych owoców		
drzewa owocowe	szkodniki wielożerne		zbieranie i wyносzenie poza obręb ogrodu złóż jaj pierścienicy nadrzewki, znamiówki tarniówki oraz gniazd zimowych kuprówki rudnicy	
drzewa owocowe	samice piędzika przedzimka oraz innych miernikowców		w drugiej połowie października zakładanie na pniach drzew opasek lepowych do wyłapywania wędrujących po pniu samic piędzika	
drzewa owocowe	jaja przędziorków, larwy misecznika i inne		opryskiwać powierzchnie kory bardzo dokładnie preparatem Promanal 60 EC, Emulpar 940 EC, gnojówką fermentującą z pokrzywy zwyczajnej	
drzewa owocowe	mszyce	zapobiegawczo wyciąg bez rozcieńczenia ze skrzypu polnego oraz pokrzywy, krwawnika pospolitego, czosnku pospolitego (1:1), rumianku pospolitego (1:5), cebuli jadalnej	gnojówka z pokrzywy (1:20) lub fermentującej (1:50)	
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini		Jesienią zastosować gnojówkę z pokrzywy (1:10) lub wyciąg z krwawnika pospolitego (1:10)	Zabieg Miedzianem 50 WP należy wykonać jesienią po opadnięciu liści, a Syllitem 65 WP w okresie poprzedzającym pęknięcie pąków prz temp. 6°C
Okres nabrzmiewania pąków				
brzoskwinia i morela	rak baktryjny			Miedzian 50 WP
śliwa	torbiel śliw			Syllit 65 WP
wiśnia i czereśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	unikać sadzenia szczególnie wrażliwych odmian	wycinać zaschnięte cienkie pędy poniżej nekrotycznych zmian zabieg przeprowadzić szczególnie dokładnie na tych drzewach, na których choroba licznie występowała w poprzednich latach	

drzewa owocowe	przędziorki	zapobiegawczo zastosować wyciąg z czosnku pospolitego (1:1) oraz wyciąg bez rozcieńczenia z cebuli zwyczajnej, mniszka pospolitego i napar bez rozcieńczenia z cebuli zwyczajnej	gnojówka z pokrzywy (1:20)	
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini		opryskiwać wywarem bez rozcieńczania i wyciągiem z krwawnika pospolitego (1:10); tuż przed pękaniem pąków pąków rozpocząć opryski preparatem Lecitec co 5 dni, wykonując maksymalnie 12 oprysków w sezonie, opryski Lecitec można kontynuować do fazy dojrzewania owoców	
jabłoń	mączniak prawdziwy		tuż przed pękaniem pąków pąków rozpocząć opryski preparatem Lecitec co 5 dni, wykonując maksymalnie 12 oprysków w sezonie, opryski Lecitec można kontynuować do fazy dojrzewania owoców	
Okres pękania pąków				
Jabłoń	kwiecień jabłonowiec	kwiecień jest szkodliwy tylko w latach słabego kwitnienia	w ciepłe dni wstrząsać kwiecia z drzewa na płachtę, po kwitnieniu należy zbierać i niszczyć opalone pąki zastosować wywar z wrotczyca pospolitego (1:5)	Calypso 480 SC, Decis Ogród 015 EW
Jabłoń, grusza	zaraza ogniowa	profilaktyczny oprysk z liści orzecha włoskiego lub sumaka octowca	zaatakowane drzewa wycinać i niszczyć, a w początkowym okresie występowania choroby wycinać porażone fragmenty koron	Miedzian 50 WP
mszyce			mniszek pospolity wyciąg bez rozcieńczenia	
Ukazywanie się pierwszych liści				
jabłoń, grusza	parch jabłoni, parch gruszy	uprawiać odmiany tolerancyjne, prześwietlać rośliny, usuwać opadłe liście	opryskiwanie szkłem wodnym i wyciągiem ze skrzypu	Discus 500 WG, Polyram 70 WG, Miedzian 50 WP
Jabłoń	mączniak jabłoni	unikać uprawy wrażliwych odmian	wycinać porażone pędy, opryskiwać wyciągiem z krwawnika (1:10)	Zato, Topsin 500 SC, Amistar 250 SC
Zielony pąk kwiatowy				
Jabłoń, grusza	gąsienice zjadające liście		ręczne zbieranie gąsienic	
Różowy pąk kwiatowy				
jabłoń	gąsienice przędzika i namiotków	zbieranie skupisk żerujących gąsienic namiotków w początkowym okresie ich żerowania		
Jabłoń	Owocnica jabłkowa	wykrywanie obecności owocnicy za pomocą białych tablic lepowych	wyciąg z wrotczyca pospolitego (1:2)	Calypso 480 SC
grusza	rdza gruszy		wywar ze skrzypu polnego (1:4), wywar bez rozcieńczenia z cebuli jadalnej, czosnku pospolitego	Zato 50 WG, Miedzian 50 WP

e bakterie. Opryski wykonywać co 14-21 dni, można łączyć z nawożeniem dolistnym. Guard nie łączyć z fungicydami (zachować 7

Biały pąk kwiatowy				
śliwa, czereśnia, wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	nie sadzić wrażliwych odmian	opryskiwać wyciągiem z krwawnika (1:10) lub skrzypu polnego (1:4)	Signum 33 WG, Switch 62,5WG, Topsin 500 SC, Miedzian 50 WP
	mszyce		wycinanie zakończeń pędów z koloniami mszyc opryskiwanie wyciągiem z pokrzywy lub wrotycza	Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Karate Zeon 050 CS
Kwitnienie				
Jabłoń, grusza	parch jabłoni, parch gruszy		opryskiwanie wywarem (1:4) ze skrzypu polnego lub preparatem EVASIOLE opartym na skrzypie polnym. Opryski EVASIOLEM powtarzać co 7 dni. Wykonać 2-6 oprysków do momentu zasychania kwiatów.	Miedzian 50 WP, Kaptan zawiesinowy 50 WP, Discus 500 WG, Polyram 70 WG
jabłoń	mączniak jabłoni		wycinanie pędów z objawami mączniaka, opryski preparatem EVASIOLE tak jak na parcha.	
czereśnia, wiśnia	rak bakteryjny			Miedzian 50 WP
czereśnia, wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	systematycznie usuwać porażone pędy	wyciąg z krwawnika lub odwar ze skrzypu oraz gnojówka, wywar, napar bez rozcieńczenia ze chrzanu pospolitego	Signum 33 WG, Switch 62,5WG, Topsin 500 SC, Miedzian 50 WP
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini		opryski preparatem EVASIOLE, wykonać 2-6 oprysków w odstępach co 7 dni, opryski można wykonywać do fazy zasychania pąków	Miedzian 50 WP
Koniec kwitnienia				
drzewa owocowe	szpeciele	dokładne oglądanie liści	usuwanie liści z objawami żerowania	Mospilan 20 SP, Ortus 05 SC
grusza	kwieciak gruszowiec	szczególnie groźny na starszych gruszach	na przełomie kwietnia i maja obrywać brązowe pąki zimowe z larwami kwieciaka	Decis Ogród 015 EW
śliwa	owocnica żółtoroga	wykorzystywać białe pułapki lepowe	usuwanie z drzew i niszczenie zawiązków ze świeżymi wgryzami, przekopywanie w czerwcu ziemi pod drzewami	Calypso 480 SC
drzewa owocowe	mszyce		opryski z pokrzywy, czosnku, cebuli	Calypso 480 SC
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini	w przypadku występowania choroby oprysk wykonać jesienią po opadnięciu liści	systematycznie usuwać porażone liście, drzewa opryskiwać wyciągiem z krwawnika, skrzypu polnego, pokrzywy, opryski preparatami Lecitec (co 5 dni), Evasiol (co 7 dni)	
Po kwitnieniu				
wiśnia	drobna plamistość drzew pestkowych	unikaj uprawy wrażliwych odmian	usuwać opadające liście	Syllit 65 WP, Kaptan zawiesinowy 50 WP, Topsin M 500 SC
Okres rozwoju zawiązków				
jabłoń	parch jabłoni		wywar ze skrzypu polnego (1:4)	Kaptan zawiesinowy 50 WP, Discus 500 WG, Polyram 70 WG

Jabłoń	mączniak jabłoni		odwar ze skrzypu, opryski preparatem Lecitec (co 5 dni)	Zato 50 WG, Topsin 500 SC, Amistar 250 SC
jabłoń, śliwa	owocówka	zwalczanie należy ustalić na podstawie stopnia opanowania w poprzednim roku za pomocą tablic lepowych	zawiesić pułapki feromonowe zawiesić na drzewach, gąsienice wyłapywać za pomocą opasek z papieru falistego zakładanych na pniu drzew	Calypso 480 SC
czereśnia, wiśnia	nasionnica trześniówka	przykrywanie siatką powierzchni ziemi, w obrębie korony w okresie spodziewanego wylotu, przekopywanie gleby pod drzewami po zbiorze owoców	żółte pułapki lepowe zawiesić w drugiej połowie maja, przy opanowaniu zebrać owoce przed osiągnięciem dojrzałości, aby zapobiec wejściu larw w glebie	Calypso 480 SC
Okres wzrostu owoców				
jabłoń	parch jabłoni		opryskiwać odwarem ze skrzypu polnego (1:4)	
Jabłoń	mączniak jabłoni		obrywanie porażonych liści, opryskiwać wyciągiem z krwawnika	
Jabłoń	mszyca jabłoni	szczególnie groźna na młodych drzewkach	wycinać pędy porażone mszycami	Calypso 480 SC
Jabłoń	bawełmica korówka	najbardziej liczna na starych drzewach	ręczne zbieranie mszyc	rany powstałe przy żerowaniu bawełnicy zabezpieczyć Actara 25 WG
śliwa	mszyce		opryskiwać wyciągiem z wrotycza i pokrzywy	
grusza	parch gruszy		oprysk odwarem ze skrzypu polnego	
Po zbiorach				
Jabłoń, grusza	parch		Oprysk 5% roztworem mocznika w okresie opadania liści z drzew. Opryskujemy dokładnie całą koronę drzewa i liście już opadłe	

Tutaj kupisz środki ochrony roślin wymienione w tabeli:

Środki Ochrony Roślin - Sklep Ogrodniczy

PoradnikOgrodniczy.pl
Twój Ogród Piękny i Zdrowy